

有移交优先的检查

乳酸 - 铵 - 酸基平衡

因为得到最靠谱的结构所以应该尽快地交付样品。

请遵循下面的须知：

- 在登记的窗口请拿PRECEDENZE（优先）的票
- 请马上带卷宗去卫生的部门。那儿人员要收取试管也采集（还有优先）。请移交样品给人员。

他们要放样品在融冰也尽快地输送给实验室。

时刻表：

- 星期一到星期五7：45或者9：45
- 星期六8：45

氨基酸也有优先。家庭医生应该填表格。（星期六不做氨基酸的检查）

醛固酮 ‘肾素

因为白天激素的浓度

改易得很多，所以最好早上8点以前做第一个采样。5天以前抽血，用户能吃食粮的盐在他的饮食。

做采样两个星期以前别吃药（请教您的医生）。特别是：

- 血管紧张肽I转化酶抑制剂
- 非甾体抗炎药
- β 受体阻断药
- 钙离子通道阻滞剂

作第一个采样的时候用户应该**站立**（也两个小时以前要站立）。

后来用户应该**躺下**和休息两个小时。两个小时躺下了以后能做第二个采样。

关于糖耐力测试的须知

为成人。先作糖耐力测试，后来做血糖‘胰岛素的剂
量

应该预定检查（在医院的窗口或者给医院打电话）。

请拿PRECEDENZA(优先)的票。

剂量75克

- 为了做这个检查需要禁食（最少8个小时，最多14个小时）
- 因为测量血糖的水平所以先做抽血。
按照测量的结构能决定继续检查没有。
- 用户应该喝75克葡萄糖浆在3分钟之内的时间
- 这种检查能引起恶心。如果有恶心的话能问人员一辈子水。如果呕吐的应该暂停检查，后来在从零开始。
- 喝了葡萄糖浆以后需要在医院采样部门的候诊室休息叶等检查的终结。不要吃也不要吸烟。可以喝少水。
- 喝了葡萄糖浆30 ‘60 ‘90 ‘120 分钟以后要作抽血

在采样的部门一共需要留两个半小时。

如果应该做6个抽血（150
分钟以后），应该还留在候诊室半个小时。

怎么拾取尿液（24个小时）

在一个塑料的刻度容器，要采集白天也夜里的尿液：

- 早上第一次撒尿应该脱掉。请记录几点（例如早上7点）。增添白天也夜里的尿液
- 第二天，早上结束采集尿液（例如早上7点）
- 测量也记录多少尿液，
然后把几分尿液放在药店买的小杯，给医院的采样部门

怎么拾取尿液（24个小时）

用盐酸

做这种检查为了测量：

- 儿茶酚胺（多巴胺‘肾上腺素‘去甲肾上腺素）
- 变肾上腺素

为了采集24个小时的尿液，请严格遵守下面的说明：

- 在药店买容器为采集尿液（3或者4升容量）。在容器的底子浇4把汤匙没有除垢剂的盐酸（在商店常见）

因为盐酸 非常腐蚀也刺激所以特别注意（别用次氯酸钠）

- 早上第一次撒尿应该脱掉。请记录几点（例如早上7点）。增添白天也夜里的尿液
- 每次增添以后，要彻底得搅动。第二天，早上结束采集尿液（例如早上7点）
- 最后请彻底得搅动‘测量也记录多少尿液。
然后把几分尿液放在药店买的容器，给医院的采样部门

作者个检查以前请教您的医生。我们建议忌口：

48个小时以前也采集尿液的时候，别吃辣椒或者别的辣椒素的食品。

辣椒素还在一些饮料或者营养补充品。

因为一些药也有辣椒素，所以请教您的医生。

怎么拾取尿液（24个小时）

用盐酸

做这种检查为了测量：

- 钙
- 磷
- 镁

为了采集24个小时的尿液，请严格遵守下面的说明：

- 在药店买容器为采集尿液（3或者4升容量）。在容器的底子浇7把汤匙没有除垢剂的盐酸（在商店常见）

因为盐酸 非常腐蚀也刺激所以特别注意（别用次氯酸钠）

- 早上第一次撒尿应该脱掉。请记录几点（例如早上7点）。增添白天也夜里的尿液
- 每次增添以后，要彻底得搅动。第二天，早上结束采集尿液（例如早上7点）
- 最后请彻底得搅动‘测量也记录多少尿液。然后把几分尿液放在药店买的容器，给医院的采样部门

怎么拾取尿液（24个小时）

碱化

做这种检查为了测量：

- 尿酸

为了采集24个小时的尿液，请严格遵守下面的说明：

- 在药店买容器为采集尿液（3或者4升容量）。在容器的底子浇**4把汤匙碳酸氢钠**
- 早上第一次撒尿应该脱掉。请记录几点（例如早上7点）。增添白天也夜里的尿液。
每次增添以后，要彻底得搅动。第二天，早上结束采集尿液（例如早上7点）
- 最后请彻底得搅动‘测量也记录多少尿液。
然后把几分尿液放在药店买的容器，给医院的采样部门

怎么拾取尿液（24个小时）

做这种检查为了测量：

- 尿液的碳酸

为了采集24个小时的尿液，请严格遵守下面的说明：

- 在药店买容器为采集尿液（3或者4升容量）。在容器的底子浇一层液体凡士林的薄膜或者甲苯
- 早上第一次撒尿应该脱掉。请记录几点（例如早上7点）。增添白天也夜里的尿液。每次增添以后，要彻底得搅动。
- 第二天，早上结束采集尿液（例如早上7点）
- 最后请彻底得搅动‘测量也记录多少尿液。
- 然后把2/3尿液放在药店买的无菌容器，
- 上面再浇一层液体凡士林的薄膜或者甲苯，给医院的采样部门。

注意：一是半会采样能放在冰箱。别用采样为了做别的检查。

怎么拾取尿液（24个小时）

做这种检查为了测量：

- 糖尿

请严格遵守下面的说明：

- 在药店买容器为采集尿液（4或者5升容量）
- 早上第一次撒尿应该脱掉。请记录几点（例如早上7点）。增添白天也夜里的尿液。
每次增添以后，要彻底得搅动。第二天，早上结束采集尿液（例如早上7点）
- 最后请彻底得搅动‘测量也记录多少尿液。
然后把几分尿液放在药店买的容器，给医院的采样部门

注意： *已经采集了的尿液应该放在冰箱*

尿培养

- 我们建议先采集尿液，然后开始抗菌素的治疗
- 在家需要用水和肥皂精心得洗外面的性器官。没有好好洗的外面的性器官能引起采样**不适宜**‘**虚惊**。
- 采集应该是无菌的。别采集尿液第一个部分：要用第二个部分。采集的时候 特别注意别触容器的边缘‘**里面**。
- 容器关闭了以后，把尿液淘选在试管里：先掀盖子上的胶黏，后来将试管插入圆孔中，将其完全推下。
- 等到试管满载了‘**抽取试管最后用胶黏再关闭圆孔**。
- 如果采集是在家里做了， 请用冰袋运送采样。

精子培养

请预定这个检查： *星期一到星期五上午9点到12点， 下午14点到15点30， 给0303995654打电话。*

请严格遵守下面的说明：

- 做检查24个小时以前，用户不应该性交
- 采集以前请心得洗外面的性器官 ‘手。
- 射精都应该放在无菌容器。
- 如果也应该做尿液培养，最好事先作尿液培养，然后精子培养。
- 我们建议先采集尿液，然后开始抗菌素的治疗. 请告诉我们万一正在做治疗或者刚才结束了。

在采样建筑物Stauffer部门，第二层，珍室208，请递交采样。

粪便的透明胶检测

需要的材料:

- 透明胶
- 玻璃片（可以在采样部门或者在微生物实验室领取）
- 剪刀

什么时候采集采样？早上大解以前和一或者洗

怎么才基采样？

- 用剪刀剪透明胶：跟玻璃片的长度一样
- 摁透明胶的胶黏部分在肛门，然后在一张玻璃片
- 用纱布或者药棉徐徐得摁，以便能好好得粘贴玻璃片
- 作这种举动以前也以后请好好洗手。采集采样的时候，最好用一次性的手套。

递交：准备好了的采样请递交给微生物实验室在72个小时采集之内

为了证实检测的负结构，需要带一些采样（4到6个采样，在连续天的时候采集了）。

寄生虫的检测

怎么采集也保藏粪便

- 在一张干涸也干净的顶面（例如：一张纸或者塑料袋）采集粪便。
- 早上或者前例的晚上采集粪便。采样应该在冰箱保藏了。

如果要求的检测关于一个采样：

- 把粪便移交在合适的容器：需要放在容器里至少 比半个容器多

如果要求的检测关于三个采样：

- 把粪便和防腐剂移交在合适的容器（在采集部门可以免费的拿防腐剂）。
- 容器的一共内容（粪便加防腐剂）应该到容器的水平线。
这条线下或者上不行（寄生虫不能好好测定）。
- 粪便移交在合适的容器以后，请徐徐地振动：以便助长寄生虫（如果有）的灵验保藏。
- 有防腐剂的采样应该常温保藏
。用户能递交采样都在一起，给采样部门。

怎么采集采样为了找隐血

免疫的方法

为用户的须知:

- 3个采样的检查: 在3不同的次抽粪便, 最好3天一连。
- 万一在粪便‘尿液里能看血(例如月经‘痔疮‘泌尿道感染)
别采集粪便。
- 开始采集7天以前也采集的时候, 不能吃非甾体抗炎药。如果需要的话, 对乙酰氨基酚可以吃

怎么采集采样:

- 在一张干净的顶面 采集粪便。
- 拔除容器的盖子和它的小杆。
- 几次粪便上横向和纵向地磨蹭小杆, 以便采集一点粪便的采样
- 把小杆放在容器的管子, 关闭容器然后振动。
- 至多7天在冰箱保藏采样



怎么采集精液为了精液分析

请**预定**这个检查： *星期一到星期五， 给0303995374打电话。*

请严格遵守下面的说明：

- 做检查以前（至少2天，最多7天），用户不应该性交或者散精液
- 最好是在采样部门采集采样（如果在家里作，别采集早上7：30以前）
- 采集是通过手淫应该做。把采样放在药店买的无菌容器；请记录采集的时间
- 在温暖的地方保藏采样
- 万一有问题，请几天以前退订

怎么递交采样：

采集了以后，用户应该去Spedali Civili医院亲自递交采样

注意：应该上午9点之内严格地递交采样。递交的地方是：分析实验室D部门，14楼梯，底层。



痰培养

容器： 无菌 ‘大口 ‘有螺丝的盖子

什么时候采集采样： 早上， 斋戒

怎么采集采样： 通过漱流 好好洗口腔。

别用口腔杀菌。通过咳嗽，试图从深支气管的分泌得到采样。

递交： 尽快地给实验室递交采样。

如果不可以，能当24个小时的时间在冰箱（+4° 到+8° ）保藏采样

我们建议先采集采样，然后开始抗菌素的治疗。
不管怎样请告诉实验室正在做的治疗或者万一有症状。在初试的时候，如果发现采样大部分有唾液的原因，我们要归类“不当”也不再做别的分析。



肌酐酞的间隙率

怎么拾取尿液 (24个小时)

用户因该喝（开始采集尿液15分钟以前，左有500毫升水）为了担保足够利尿。

做检查的天，**不可以喝咖啡**‘茶或者吃药（倘能如此）。

为了采集24个小时的尿液，请严格遵守下面的说明：

- 早上第一次撒尿应该脱掉。请记录几点（例如早上7点）。
- 增添白天也夜里的尿液。
- 第二天，早上结束采集尿液（例如早上7点）
- 最后请彻底得搅动‘测量也记录多少尿液。
- 然后把几分尿液放在药店买的容器，记录多少尿液，最后递交给医院的采样部门。



STAMEY 检查

先前列腺的按摩后来尿液培养

（在泌尿诊所作了）

先泌尿科医生应该看病，然后医生作处方

这种检查是在专家的诊所安排也开刀了。

在无菌的容器采集2个尿液的采样（先按摩10毫升，按摩以后10毫升）。

用户应该带采样和先泌尿科医生的处方在一起。然后登记医院的窗口（跟别的检查一样）



怎么拾取尿液为尿液的细胞检测

在三连天的时候应该采集采样。不用大斋。

请别用夜里的尿液，可是采集早上第二次撒尿（例如：早上正常的撒尿，然后河2/3杯子水，最后采集后来的尿液）。

- 在一个干净的容器采集尿液；
- 打开 “**CAMPIONE 1**”。在固定液中加入一点尿液：应该添补容器（万一有问题撒尿能接受不满载的容器）
- 好好关闭容器；
- 在容器上将贴一张有您的姓‘名字等的招牌纸。
- 容器应该在冰箱保藏了。
- 第二天和第三天再用一样的方法采集尿液。应该用 “**CAMPIONE 2**” ‘ “**CAMPIONE 3**”
- 最后把3个容器再访盒子、递交给医院的采样部门：

Stauffer办公楼，采样的窗口，Brescia, 89 Ducco 路。

请注意

- 容器里面有的液体很可染的。别喝也保持在儿童接触不到的地方。
- 用容器的液体的时，别吃‘喝‘吸烟
- 避免与眼睛接触
- 万一与眼睛接触，用很多水洗眼睛
- 好好关闭的容器应该在阴凉的地方被保藏了

用处方的准入

为了做尿液的细胞检测需要在Stauffer办公楼，底层，采样的窗口，Brescia, 89 Ducco 路拾取三个容器。时刻表：星期一到星期六，7点15到11点钟。拾取容器的时候也应该预定什么时候送交采样。

另外容器也能在采集部门第一层，被拾取了，星期一到星期六11点到13点。

万一需要关于检查问事也能给030/3996310打电话，星期一到星期六11点30到13。

拾取检测结构的窗口的时刻表：星期一到星期五8点到17点30。

星期六8点到12点。为了得到关于检查结构的咨询请给030/3995336打电话，星期一到星期五12点到14点。



粪便检查

- 安排把采样递交给实验室的那一天早上，要采集粪便。也可以至迟一天的下午不过需要把采样放在冰箱里（别冰冻）
- 在一个干爽的地方（采集的容器‘盆儿‘草纸等可是不在坐厕）大便
- 如果有坚硬的粪便，用容器的小铲子采集一点粪便（跟桃仁的大小一样）。如果有液体的粪便填补到容器三分之一的容量。