



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 1 di 24

Data: Agosto 2020

تحاليل مع أسبقية التسليم

- حمض اللاكتيك
- الأمونيوم
- التوازن الحمضي القاعدي
- الحمض الأميني

للحصول على نتائج موثوقة يجب تسليم العينة في أقرب وقت ممكن.
لذلك يرجى اتباع التعليمات التالية :

- القيام بالإجراءات الإدارية بأخذ تذكرة الأسبقية
- الذهاب للمنطقة الصحية مع الملف لتتلقى الأنابيب وسيتم أخذ العينة (دائما مع احترام الأسبقية).
- العينة سيتم تسليمها للعامل الصحي الذي سيحفظها في الثلج والذي بدوره سيسلمها للمختبر في أقرب وقت ممكن.
- لكي يحدث كل هذا من الضروري احترام المواعيد :
- من الاثنين إلى الجمعة : الساعة 7:45 ، 8:45 و 9:45
- السبت : الساعة 8:45 و 9:45

تحددات أخرى ذات أولوية التسليم هي الأحماض الأمينية التي يلزم أيضا ملء النموذج المناسب من قبل الطبيب المعالج (لا يتم إجراء الأحماض الأمينية في أيام السبت).

لخدمة التحاليل في مختبر Gardone V.T

تتم عمليات التسليم مباشرة في المختبر (بدون أسبقية أو وقت محدد)

بالنسبة لخدمة التحاليل في مختبر Via Corsica

لكي يكون هذا ممكنا، من الضروري احترام أوقات معينة :
من الاثنين إلى الجمعة الساعة 9.45 صباحا
السبت 8.45 صباحا

ESAMI CON PRIORITA' DI CONSEGNA

ACIDO LATTICO - AMMONIO - EQUILIBRIO ACIDO-BASE (EAB)- AMINOACIDI



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01

Pagina 2 di 24

Data: Agosto 2020

الدوستيرون ورينينا بلازميتشي

يتغير تركيز الهرمونات بشكل كبير خلال اليوم، لذلك فمن الأفضل أن يتم إجراء أخذ العينات الأولى قبل الساعة 8 صباحاً.

خلال الأيام الخمس التي تسبق أخذ العينات يمكن للمريض تناول نظام غذائي عادي.

خلال الأسبوعين التي تسبق سحب الدم، ينصح بعد استشارة الطبيب المعالج، بتجنب تناول الأدوية وعلى وجه الخصوص:

1 مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين

2 مضاد الالتهابات دون ستيرويد

3 حاصرات - بيتا

4 الكالسيوم

يتم تنفيذ السحب الأول في وضع راسي : يجب على الشخص أن يكون واقفا لمدة ساعتين على الأقل.
بعد ذلك، يتم إجراء سحب العينة الثانية في وضع استرخاء، بعد أن يتم استلقاء الشخص على الأقل لمدة ساعتين في حالة راحة تامة،



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 3 di 24

Data: Agosto 2020

منحنيات تحميل الجلوكوز تعليمات التنفيذ في المواد البالغة المتعلقة بجرعات الجلوكوز والأنسولين

حمولة كاملة 75 غرام

- اختبار يشترط فيه الصيام لمدة (لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 14 ساعة).
- يتم أخذ عينة من الدم لقياس مستوى الجلوكوز الأساسي في الدم، ومن خلال القيمة المحصل عليها يتقرر ما إذا كان الشخص سيكمل الاختبار.
- يتم شرب محلول يتكون من شراب يحتوي على 75 غرام من الجلوكوز ويجب تناوله في غضون ثلاث دقائق.
- المشكلة الوحيدة التي يمكن أن يسببها هذا الشراب هي الإحساس ببعض الغثيان، يمكن شرب الماء عند الحاجة، في حالة حدوث القيء يجب تعليق الفحص.
- بعد شرب محلول الجلوكوز، يجب أن تستريح في غرفة الانتظار الخاصة بالتحاليل، وهو الوقت اللازم لإنهاء الاختبار. خلال هذه الأثناء لا يمكنك التدخين أو الأكل ويمكنك شرب الماء فقط.
- في الأخير، يتم سحب عينة الدم بعد 30، 60، 90، 120، 150 دقيقة بعد تناول المحلول الذي يحتوي على الجلوكوز.

إجمالي الوقت الذي يحتاجه الاختبار ساعتان و 30 دقيقة
إذا كانت هناك حاجة إلى التحديدات الستة لمنحنى نسبة السكر في الدم، يتم إجراء عينة أخرى بعد 150 دقيقة مع بقاء الشخص لمدة 30 دقيقة أخرى.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 4 di 24

Data: Agosto 2020

منحنيات تحميل الجلوكوز للبالغين

يجب جمع البول على مدار 24 ساعة باتباع التعليمات التالية بدقة:

في وعاء مندرج، يتم جمع البول خلال النهار والليل كما يلي :

- تخلص من أول بول الصباح وحدد الوقت (على سبيل المثال 7 صباحا)، أضف تدريجيا البول الذي تم اطلاقه خلال النهار بما في ذلك أي اتبعات ليلية.

- في صباح التالي، قم بإنهاء التجميع مع خروج البول في نفس وقت اليوم السابق (7 صباحا).

- في نهاية الجمع، قم بقياس الكمية وضع علامة عليها، خذ جزءا صغيرا وقم بتسليمه في أنبوب اختبار إلى مختبر أخذ العينات.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 5 di 24

Data: Agosto 2020

طريقة جمع البول المحمضة خلال 24 ساعة لتحديد : - الدروستيرون

تحذير : اطلب من الصيدلي تحضير ثلاث أكياس يحتوي كل منها على 10 غرام من حمض البوريك. نسبة حمض البوريك مقارنة بالبول هي 10 غرام لكل لتر من البول.

يجب جمع البول على مدار 24 ساعة باتباع التعليمات التالية بدقة :

- تصب في قاع الإناء المصمم لجمع البول بسعة 3-4 لترات، 10 غرام من مسحوق حمض البوريك (كيس واحد)، يتم الحصول عليها من الصيدلية.

- تخلص من أول بول الصباح وحدد الوقت (على سبيل المثال 7 صباحا)، أضف تدريجيا البول المنبعث خلال النهار بما في ذلك أي انبعاثات ليلية، إذا تم تجاوز 1000 مل (1 لتر) أثناء الجمع، أضف 10 غرام أخرى من حمض البوريك (الكيس الثاني). إذا تجاوزت 2 لتر، أضف 10 غرام أخرى من حمض البوريك (الكيس الثالث).
- يتم الخلط جيدا بعد كل إضافة، في صباح اليوم التالي، قم بإنهاء التجميع مع خروج البول في نفس وقت اليوم السابق (7 صباحا).

- في نهاية الجمع، اخلط جيدا، وقم بقياس الكمية وتمييزها، خذ جزءا صغيرا وقم بتسليمه في أنبوب اختبار إلى مختبر أخذ العينات.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01

Pagina 6 di 24

Data: Agosto 2020

طريقة جمع البول المحمضة خلال 24 ساعة

لتحديد :

- كاتيكولامين (الدوبامين، الاندريمالين والنوراندريمالين)

- ميتفرين

- حمض أوموفانيلي

- حمض الفانيلمانديليك

يجب جمع البول على مدار 24 ساعة باتتباع التعليمات التالية بدقة :

- تصب في قاع الاناء المصمم لجمع البول بسعة 3 - 4 لتر، 4 ملاعق كبيرة من حمض الرياتيك بدون منظف، وهو شائع في السوق.

يجب أخذ أقصى درجات الحذر لأن الحمض شديد التآكل ومزعج (لا تستخدم هيبوكلوريت الصوديوم).

- تخلص من أول بول الصباح وحدد الوقت (على سبيل المثال 7 صباحاً)، أضف تدريجياً البول المنبعث خلال النهار بما في ذلك أي انبعاثات ليلية.

- يجب الخلط جيداً بعد كل إضافة، في صباح اليوم التالي، قم بإنهاء التجميع مع خروج البول في نفس وقت اليوم السابق (7 صباحاً).

- في نهاية الجمع، قم بالخلط جيداً، وقم بقياس الكمية وضع علامة عليها، وخذ جزء صغير وقم بتسليمه في أنبوب اختبار إلى مختبر أخذ العينات.

يوصي أخصائيو المختبرات، بعد التشاور مع الطبيب المعالج، تعليمات لحماية غذائية خلال 48 ساعة قبل بدأ جمع البول، وكذلك طوال فترة جمع البول على مدار 24 ساعة، من الضروري مراقبة نظام غذائي خالي من مشتقات الفلفل الحار أو الكابيسين.

ثم العثور على المشتق المذكور أيضاً في المشروبات والمكملات الغذائية. يوجد كذلك في بعض الأدوية، لذا ينصح باستشارة الطبيب المعالج.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMel 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 | Pagina 7 di 24

Data: Agosto 2020

طريقة جمع البول المحمض على مدار 24 ساعة للكاتيولامين

لتحديد :

- الكالسيوم
- الفوسفور
- المغنيسيوم

يجب جمع البول على مدار 24 ساعة باتباع التعليمات التالية بدقة :

- تصب في قاع الإناء المصمم لجمع البول بسعة 3 - 4 لتر، 7 ملاعق كبيرة من حمض المريكبات غير المعطر المتاح عادة في السوق.
- يجب توخي أقصى درجات الحذر لان الحمض شديد التآكل ومزعج (لا يجب استخدام هيبوكلوريت الصوديوم).
- تخلص من أول البول في الصباح وحدد الوقت (على سبيل المثال 7 صباحا)، أضف تدريجيا البول الذي تم اطلاقه خلال النهار بما في ذلك أي انبعاثات ليلية.
- يجب الخلط جيدا بعد كل اضافة، في صباح اليوم التالي، قم بإنهاء التجميع مع خروج البول في نفس وقت اليوم السابق (7 صباحا).
- عند الانتهاء من الجمع، اخلط جيدا، وقم بقياس الكمية وتمييزها، خذ جزءا صغيرا وقم بتسليمه في أنبوب اختبار إلى مختبر أخذ العينات.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 8 di 24

Data: Agosto 2020

طريقة جمع البول القلوي لمدة 24 ساعة لتحديد : - حمض اليوريك

يجب جمع البول على مدار 24 ساعة باتباع التعليمات التالية بدقة.

- تصب 4 ملاعق كبيرة مملوءة بببيكربونات الصوديوم في قاع وعاء مخصص لتجميع البول بسعة 3 - 4 لترات.

- تخلص من أول بول الصباح وحدد الوقت (على سبيل المثال 7 صباحاً)، أضف تدريجياً البول المنبعث خلال النهار، بما في ذلك الليل، تخلط جيداً بعد كل إضافة. في صباح اليوم التالي، قم بإنهاء التجميع مع خروج البول في نفس وقت اليوم السابق (7 صباحاً).

- في نهاية التجميع، اخلط جيداً، وقم بقياس وتمييز الكمية الإجمالية للبول، وخذ جزءاً منه وقم بتسليمه في أنبوب اختبار إلى مختبر أخذ العينات.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01

Pagina 9 di 24

Data: Agosto 2020

طريقة جمع البول على مدار 24 ساعة لتحديد : - البيكربونات البولي

يجب جمع البول على مدار 24 ساعة باتباع التعليمات التالية بدقة :

- يجب صب عازل من الفازلين السائل أو التولوين الذي يتم شراؤه من الصيدلية في قاع وعاء مخصص لتجميع البول بسعة 3 - 4 لتر.

- تخلص من أول بول الصباح وحدد الوقت (على سبيل المثال 7 صباحاً)، أضف تدريجياً البول المنبعث خلال النهار بما في ذلك أي انبعاثات ليلية.

- في صباح اليوم التالي، قم بإنهاء التجميع مع خروج البول في نفس وقت اليوم السابق (7 صباحاً)، قم بخلط وقياس وتسجيل الكمية الإجمالية للبول.

- صب كمية من البول في وعاء معقم لجمع البول واملأه على الأقل ¾ ممتلئ.

- قم بتغطية السطح بعازل من التولوين أو الفازلين وتسليمه إلى مختبر أخذ العينات.

ملحوظة : يمكن تخزين العينة في الثلاجة لبضع ساعات ولا يمكن تخزينها لاستخدامها في أي اختبارات أخرى.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 | Pagina 10 di 24

Data: Agosto 2020

طريقة جمع البول على 24 ساعة لتحديد : جليكوسوريا

يجب التقيد الصارم بالتعليمات التالية :

- استخدام وعاء مخصص لتجميع البول بسعة 4 - 5 لترات.

- تخلص من أول بول الصباح وحدد الوقت (على سبيل المثال 7 صباحا). قم بإضافة البول تدريجيا المنبعث خلال النهار، بما في ذلك التبول الليلي، في صباح اليوم التالي، قم بإنهاء التجميع مع خروج البول في نفس وقت اليوم السابق (7 صباحا).

- في نهاية الجمع، اخلط جيدا، و قم بقياس وتسجيل الكمية الإجمالية للبول المنبعث، خذ جزءا منه في أنبوب اختبار و قم بتسليمه إلى مختبر أخذ العينات.

ملحوظة : يمكن تخزين العينة في الثلاجة لبضع ساعات ولا يمكن تخزينها لاستخدامها في أي اختبارات أخرى.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMel 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 11 di 24

Data: Agosto 2020

ثقافة التبول

يجب التقيد الصارم بالتعليمات التالية :

- عينة الفحص هي من البول الأول في الصباح.
- يوصى بجمع العينة قبل بدء العلاج بالمضادات الحيوية.
- من الضروري توفير تنظيف شامل للأعضاء التناسلية الخارجية باستخدام الصابون والماء في المنزل.
- يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن عدم تنظيف الأعضاء التناسلية الخارجية قد يؤدي إلى ظهور عينة إيجابية خاطئة.
- يجب أن يتم بطريقة معقمة، ويجب عدم أخذ الجزء الأول من البول ولكن الجزء الثاني (القشرة المتوسطة).
- يوصى بعدم تلويث الوعاء مع الحرص على عدم لمس حافة الوعاء ودخله أثناء التجميع.
- بمجرد إغلاق الوعاء، انقل البول إلى الأنبوب.
- ارفع المادة اللاصقة على الغطاء وأدخل الأنبوب في الفتحة بدفعه للأسفل بالكامل.
- انتظر حتى يمتلئ الأنبوب بالكامل وقم بإزالته.
- أغلق الفتحة بالمادة اللاصقة الواقية.
- يفضل أن يتم أن يتم الجمع في المنزل، باتباع التعليمات المذكورة أعلاه، وتسليم العينة إلى **SPE** في غضون ساعتين من الجمع.
- لا يمكن جمع العينات في مختبر أخذ العينات إلا إذا كان التبول الأول في الصباح، مع اتباع تعليمات النظافة المذكورة أعلاه بدقة.

ملحوظة : في حالة زراعة البول لحديثي الولادة أو عند الرضع، من المستحسن أن يتم جمع البول في مختبر أخذ العينات حيث يتم التحضير والجمع من قبل الأخصائيين لتجنب تلوث العينة. تذكر عدم وضع الكريمات والمراهم من المساء قبل الاختبار.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 12 di 24
Data: Agosto 2020

تربية الحيوانات المنوية

يتم الفحص بالحجز من الاثنين الى الجمعة، عن طريق الاتصال بالرقم **3995654 030**
(من الاثنين الى الجمعة، من 9.00 الى 12.00 و 14.00 الى 15.30)

اتبع التعليمات أدناه بعناية :

- يجب ألا يمارس الشخص الجماع خلال 24 ساعة السابقة للاختبار.
- يجب أن يسبق التجميع تنظيف شامل للأعضاء التناسلية الخارجية واليدين.
- يجب جمع السائل المنوي في وعاء معقم.
- إذا كانت مزرعة البول مطلوبة أيضاً، فمن المستحسن جمع البول أولاً.
- ينصح بجمع العينة قبل بدء العلاج بالمضادات الحيوية، وفي جميع الأحوال، يجب الإبلاغ عن أي علاج مستمر أو حديث.

لخدمة أخذ العينات من مختبر Gardone VT
يتم قبول العينات وتسليمها في مختبر التحليل

لخدمة أخذ العينات من مختبر Montichiari
يتم قبول العينات وتسليمها في مختبر التحليل
ينصح الاتصال بالطبيب مسبقاً على الرقم 030.9963343



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 13 di 24

Data: Agosto 2020

اختبار FECA سكوتش

المواد المطلوبة :

- شريط لاصق شفاف
- شرائح العينة (يمكن أخذها من مختبر أخذ العينات)
- مقص

متى يتم أخذ العينة : في الصباح قبل التبرز و/أو الغسيل.

كيفية أخذ العينة :

- باستخدام المقص، قم بقص قطعة من الشريط اللاصق بطول شريحة المجهر.
- اضغط على الجزء اللاصق من الشريط الموجود على فتحة الشرج ثم على الشريحة.
- باستخدام شاش أو قطعة قطن، اضغط برفق حتى يلتصق الشريط جيدا بالشريحة
- اغسل يديك جيدا قبل وبعد هذه العملية، ومع ذلك، فمن المستحسن استخدام القفازات التي تستخدم لمرة واحدة أثناء جمع العينات.

للتوصيل :

- يجب أن تصل العينات المعدة إلى خدمة الأحياء الدقيقة في غضون 72 ساعة من جمعها.
- هناك الحاجة إلى عدة عينات (من 4 إلى 6 يتم جمعها في أيام متتالية) لتأكيد النتيجة السلبية.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 14 di 24

Data: Agosto 2020

البحث عن الطفيليات : طريقة جمع البراز وتخزينه

- يجب جمع البراز على سطح جاف ونظيف (مثل ورقة أو كيس بلاستيكي).
- جمع البراز في الصباح أو المساء السابق وتخزين العينة في الثلاجة.

في حالة طلب الفحص على عينة واحدة :

ينقل البراز إلى الوعاء المناسب، يجب أن يتم نقل البراز وأن يتجاوز حجمه نصف الوعاء.

في حالة طلب الفحص على 3 عينات :

- يجب نقل البراز إلى وعاء خاص مع مادة حافظة (إذا كان الاختبار تابع إلى مختبر المستشفى شيفيلي، فالوعاء يعطى مجاناً في مختبر أخذ العينات).
- في هذه الأوعية، يجب أن يصل المحتوى الكلي (البراز + المادة الحافظة) إلى الخط المشار إليه في ملصق الوعاء نفسه. نسبة أقل أو أكثر لا تسمح بالتنشيط الصحيح للطفيليات.
- مباشرة بعد نقل البراز إلى الوعاء، قم برجه برفق من أجل تقضيل التخزين الصحيح للطفيليات، إن وجدت.
- يجب تخزين العينات ذات المثبت في درجة حرارة الغرفة ويمكن تسليمها معاً.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 15 di 24

Data: Agosto 2020

البحث عن الكلاميديا طريقة جمع البول

يجب جمع البول وفق التعليمات التالية:

- يجب عدم التبول خلال الساعتين الماضيتين
- أخذ البول من الخروج الأول
- يجب أن يتم جمع البول في أنبوب ذات غطاء أحمر، متوفر في مختبرات أخذ العينات، في غضون ساعتين من جمعه.

من أجل خدمة أخذ العينات لمقر مستشفى شيفيلي وإذا كانت الحاجة إلى مساحة مجرى البول أو إجراء بحث عن الميكوبلازما أو غير ذلك، فمن الضروري تحديد موعد في العيادة الخارجية المحددة من خلال الاتصال على 0303995654 من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9.00 إلى 12.00 ومن الساعة 14.00 إلى 15.30.

لخدمة أخذ العينات من مختبر Gardone VT
إذا كانت الحاجة أيضا إلى مساحة لمجرى البول أو إجراء بحث عن الميكوبلازما أو غير ذلك، فمن الضروري تحديد موعد في العيادة الخارجية المحددة عن طريق الاتصال بالرقم 030224466 أو عن طريق الذهاب مباشرة إلى CUP في مقر Gardone VT.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 16 di 24

Data: Agosto 2020

تعليمات لجمع عينات من البحث عن الدم المختبئ بطريقة البراز المناعي

تعليمات للمستخدم :

- لإجراء التحليل بشكل صحيح، يجب العثور على الحاويات في مختبر أخذ العينات
- في البحث على ثلاث عينات، قم بجمع المواد البرازية في 3 تصريفات مختلفة، ويفضل أن يكون ذلك في 3 أيام متتالية
- لا تجمع المواد البرازية إذا كان الدم مرئياً في البراز أو البول (على سبيل المثال أثناء الحيض والتهابات المسالك البولية ووجود البواسير).
- لمدة سبعة أيام قبل بدء جمع المواد البرازية وطوال فترة الجمع، تجنب الأدوية المضادة للالتهابات.
- يمكن تناول الباراسيتامول إذا لزم الأمر.

تعليمات لأخذ العينات :

- جمع البراز على سطح نظيف
- قم بإزالة الغطاء باستخدام مقياس العمق من الحاوية الخاصة به
- مرر القضيب فوق البراز عدة مرات أفقياً ورأسياً، واجمع الحد الأدنى من العينة
- أدخل القضيب في الأنبوب، وأغلق القارورة وحركها.
- قم بتخزين القوارير في الثلاجة لمدة أقصاها 7 أيام.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 17 di 24

Data: Agosto 2020

طريقة جمع السائل المنوي لسبيموغرام

يتم إجراء مخطط الحيوانات المنوية فقط عن طريق الحجز من الاثنين إلى الجمعة في الصباح ويتضمن جمع العينة المنوية في مختبر التحاليل في مستشفى Montichiari.

الحجز :

يمكن الحجز بطريقتين :

- عبر الهاتف: من خلال مركز الحجز (هاتف 030224466 من 7.30 إلى 19.30 من الاثنين إلى

الجمعة والسبت من 8.00 إلى 13.00 يوم السبت) بعد الحصول على وصفة الطبيب المعالج.

- في عداد CUP-CASSA في P.O. ل Montichiari : من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8.00 إلى

17.00 بعد الحصول على وصفة الطبيب المعالج.

إلغاء الحجز، يجب الاتصال بمركز الحجز عبر الهاتف (رقم 030224466 من الساعة 7.30 إلى

19.30 من الاثنين إلى الجمعة ومن 8.00 إلى 13.00 يوم السبت) أو الرقم المجاني 800.620.760

(يبدأ الساعة 8.30 إلى 17.30 من الاثنين إلى الجمعة ومن الساعة 8.00 إلى 13.00 يوم السبت)

التحضير للاختبار :

من الضروري :

- يسبق التقديم فترة من الامتناع عن الجماع (أو في أي حال من القذف الأخير) من 3 إلى 5 أيام.

- ان لا تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة (38°) وأن لا تتناول مضادات حيوية و/أو مضادات الالتهاب في

20 يوم التي تسبق الفحص. في حالة ارتفاع درجة الحرارة و/أو تناول الأدوية المذكورة أعلاه، قم بإلغاء الحجز.

يوم الاختبار :

اذهب مباشرة إلى الطابق الأول من P.O. Montichiari، في مختبر التحليل الإجراءات الإدارية في العداد

Precedenze (العداد المركزي الخاص بمن له حجز مسبق) وبحوزتك :

- وصفة الطبيب المعالج

- بطاقة التأمين الصحي

- صورة من بطاقة الهوية صالحة (في حالة القاصر، كذلك بطاقة الوالد أو الممثل القانوني المرافق له)

لخدمة التحليل STAUFFER P.O. Brescia

لا يتم إجراء الاختبار

لخدمة التحليل من مقر Gardone V.T

لا يتم إجراء الاختبار



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 18 di 24

Data: Agosto 2020

تحليل ثقافة البلغم

الحاوية : ذات فم كبير معقم مع غطاء لولبي

متى يتم جمع العينة : في الصباح على معدة فارغة

كيف : بعد التنظيف الدقيق لتجويف الفم عن طريق الغرغرة بالماء (لا تستخدم المطهرات الفموية) حاول الحصول، عن طريق السعال، على عينة قادمة من إفرازات الشعب الهوائية العميقة.

التسليم : يجب تسليم العينة الى مختبر التحليل في اسرع وقت ممكن، إذا لم يكن ذلك ممكناً، يمكن تخزينه في الثلاجة بدرجة حرارة $+4$ - 8 درجة مئوية لمدة 24 ساعة.
ينصح بجمع العينة قبل بدء العلاج بالمضادات الحيوية، وعلى أي حال إبلاغ المختبر بأي علاج مستمر أو حديث وأي أعراض.
سيتم تصنيف العينات التي ستنجح في التحقيقات الأولية بشكل أساسي من أصل اللعاب على أنها غير مناسبة وبالتالي لن يتم فحصها مرة أخرى.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 19 di 24

Data: Agosto 2020

فحص الكرياتينين طريقة جمع البول على مدار 24 ساعة

اتبع التعليمات أدناه بعناية :

- يجب على الشخص (تناول 500 مل من الماء قبل 15 دقيقة من بدء جمع البول) لضمان إدرار البول الكافي.
- لا تتناول القهوة والشاي والمخدرات إن أمكن في يوم الاختبار. يعتبر جمع البول الصحيح على مدار 24 ساعة الموصوف أدناه ذو أهمية أساسية لدقة تصفية الكرياتينين.
- تخلص من أول بول الصباح وسجل الساعة (على سبيل المثال 7).
- قم بإضافة البول تدريجياً خلال النهار، بما في ذلك التبول الليلي.
- في صباح اليوم التالي، قم بإنهاء التجميع مع خروج البول في نفس وقت اليوم السابق (7 صباحاً).
- في نهاية التجميع، اخلط جيداً و قم بقياس الحجم الكلي للبول
- صب جزءاً واحداً في أنبوب اختبار، أبلغ بشكل صحيح عن حجم إدرار البول وقم بتسليمه إلى خدمة التجميع.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMel 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 20 di 24

Data: Agosto 2020

طريقة جمع البول للفحص السيولوجي البولي

- يجب أن يتم جمع العينات في ثلاث أيام متتالية دون الحاجة إلى صيام.
يجب أن لا يكون البول هو البول الليلي ولكن البول الثاني من الصباح (على سبيل المثال، في الصباح، تتبول بشكل طبيعي، اشرب كوبين أو ثلاث من الماء ثم اجمع البول اللاحق)
- 1 اجمع البول في وعاء نظيف
 - 2 افتح العينة 1 وأضف كمية البول إلى المثبت حتى تمتلئ الحاوية نفسها (إذا كانت هناك صعوبات في التبول، سيتم أيضا قبول كميات أصغر)
 - 3 أغلق الحاوية بعناية
 - 4 قم بوضع ملصق كامل مع البيانات الشخصية على الحاوية
 - 5 احتفظ بالوعاء في مكان بارد (لكن ليس في الثلاجة)
 - 6 كرر الإجراء في اليوم الثاني والثالث، باستخدام حاويتي "العينة 2" و "العينة 3"
 - 7 أعد العينات الثلاث إلى الصندوق لتسليمها إلى مختبر التحليل.

الاحتياطات اللازمة للاستخدام

- المسائل الموجودة في الحاويات قابل للاشتعال، لا تشربه واحفظ الحاويات بعيدا عن الأطفال
- لا تأكل أو تشرب أو تدخن أثناء الاستخدام
- تجنب ملامسة العين
- في حالة ملامسة العينين، شطفها جيدا بالماء
- تحفظ العبوات مغلقة بإحكام في مكان بارد

فقط لخدمة التحليل في مقر الشيفولي

ضروري الحصول على وصفة الطبيب

لإجراء فحص الخلايا البولية من الضروري جمع الحاويات الثلاث من الاثنين إلى السبت من الساعة **11.00** إلى **12.50** مع الوصفة.

للحصول على أي معلومات صحية عبر الهاتف على الرقم 0303996310 من الاثنين إلى السبت من الساعة **11.30** صباحا حتى الساعة **13.00** ظهرا.

فقط لخدمة التحليل في مقر Gardona V.T

لإجراء فحص الخلايا البولية من الضروري جمع الحاويات الثلاث من معمل التحليل من الاثنين إلى السبت من الساعة **11.00** إلى **14.00**

فقط لخدمة التحليل في مقر Montichiari

لإجراء الفحص الخلوي من الضروري الاتصال بمختبر التحليل لاستلام الحاوية الخاصة.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 21 di 24
Data: Agosto 2020

الزراعة

- أجمع البراز المحتمل في صباح اليوم الذي سيتم فيه تسليم العينة إلى المختبر أو على أبعد تقدير بعد ظهر اليوم السابق واحتفظ بالعينة في الثلاجة (لا تجمد).

- بصق البراز على سطح جاف ونظيف (وعاء تجميع، حوض، ورق الحمام... وليس في المراض).

- تجمع بمغرفة الحاوية كمية من البراز بحجم حبة الجوز في حالة البراز صلب أو ثلث حجم الحاوية في حالة البراز السائل.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 22 di 24

Data: Agosto 2020

تكيس البول

لمقر التحليل ب Via Corsica

يفتح من الاثنين الى الجمعة من 7.45 الى 10.30 وفي أيام السبت من 7.30 الى 9.30

ملاحظة :

- تطبيق أكياس البول : أقصى حد 9.30

- ازالة اكياس البول : أقصى حد 10.30

المواد المطلوبة للتحليل

- كيس لاصق معقم

- شاش معقم

طريقة الجمع :

- اغسل يديك بالماء والصابون

- تنظيف الاعضاء التناسلية الخارجية للطفل تماما بالماء والصابون (نشر الشفرين الكبيرين في الانثى، سحب جلد الحشفة عند الذكر إن أمكن)

- تجفيف الجلد القضيبي بشاش معقم أو السطح الخارجي للشفرين الكبيرين في الانثى (مع الحرص على عدم تلويث المنطقة التي سبق تنظيفها بيديك).

- ضع الكيس المعقم وانتظر الطفل حتى يتبول، اذا لم يتبول الطفل خلال 30 - 40 دقيقة، يجب استبدال الكيس اللاصق وتكرار العملية بأكملها.

- بمجرد أن يتبول الطفل، أزل الكيس وأغلقه عن طريق لف الجزء اللاصق ذاتيا. عدم لمس الجدران الداخلية بيديك لتجنب التلوث.

لا تصب البول في وعاء آخر.

- ينصح بعدم صب البول وإغلاق الكيس بإحكام عن طريق لفه على نفسه

التخزين والنقل

- تسليم البول إلى المختبر في غضون ساعتين من التجميع (التخزين غير ممكن)

معايير عدم القبول

- لا يقبل استقبال البول في الحاويات:

- الغير معقمة

- ليست سليمة

- غير محكمة الإقفال لأن مع النقل يوجد احتمال تدفق البول وعدم ضمان التعقيم.

- إذا كانت اختبارات البول والبول مطلوبة، يتم إجراء الجمع في خدمة أخذ العينات حيث يتم استخدام مسحة مجرى البول بعد الغسيل والتطهير.

يوصى بعدم نقل البول وإغلاق الكيس الملفوف بإحكام، كما يمكن وضع البول في وعاء معقم (الغطاء الأحمر) فقط إذا تم تناوله بحقنة معقمة.

إذا كان طلب مسحة محيط الإحليل (الفرج أو القفلة) مرتبطا بفحص البول، فيجب عدم تنظيف الأعضاء التناسلية ويتم إجراء جمع البول دائما في مركز تجميع الأطفال (لا يتم إجراء مسحات المهبل والإحليل)



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMel 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 | Pagina 23 di 24

Data: Agosto 2020

زراعة مسالك البول من كيس القسطرة (المثانة أو الدائمة)

حاوية للتحصيل

- يجب أن تصل المادة في حاوية بلاستيكية معقمة بغطاء لولبي وفم واسع.
- بالنسبة لزراعة البول، يمكن استخدام عبوة معقمة فارغة أو مع حمض اليوريك كمادة حافظة بشكل غير مبال.
- للكشف عن ميكروبياتية بشكل قاطع، استخدام الحاويات الفارغة بدون حمض اليوريك

طريقة الجمع

- أغلق القسطرة بالملقط قبل نصف ساعة على الأقل من جمع البول
- تنظيف القسطرة خارجيا بمحلول كحولي
- نضح البول من تجويف القسطرة بحقنة معقمة
- جمع البول في عبوة معقمة

التخزين والنقل

تسليم البول إلى المختبر في غضون ساعتين، يوصى بالتخزين في 2 - 8 °C

معايير عدم القبول

- لا يقبل استقبال البول في الحاويات :
- غير المعقمة
- التي ليست سليمة
- غير مغلق تماما بمواد تتسرب الى كيس النقل حيث لم تعد ظروف التعقيم مضمونة.



Presidio
Ospedaliero
di Brescia

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

UOC Laboratorio Analisi Chimico Cliniche
SMEL 369 – Servizio Prelievi Esterni

INFORMAZIONI PER L'UTENTE Modalità di preparazione per particolari esami

Codif: LABD_SPE_ALL_Arabo
_Preparazione
Utente_Rev_01_Aug_2020

Rev. 01 Pagina 24 di 24

Data: Agosto 2020

مسحات للأطفال

يتم إجراء المسحات التالية في مقر أخذ العينات في شارع كورسيكا

- سماعة
- الشرج
- فارينيكس
- الأنفية
- بصرية
- من الجرح
- مسبق
- الفرج

لم يتم إجراء المسحة المهبلية
الاستعدادات

المسحة البلعومية

قبل ساعة واحدة من أخذ المسحة البلعومية ينصح بعدم إعطاء الأطفال حلوى أو عصائر الفاكهة

المسحة الشرجية أو الأولية أو الفولتية

احملي الطفل بعد النظافة الشخصية فقط بالماء أو المنظفات المحايدة ولا تستخدم الكريما أو المثبتات
جفف بقطعة قماش غير ورقية