Cosa posso fare: screening o visita medica

A chi mi rivolgo?

POLO TERRITORIALE

Rivolgiti al Centro IST a Brescia per eseguire i test di screening delle Infezioni Sessualmente Trasmesse con modalità riservata.

I test sono gratuiti e non è necessaria l'impegnativa del medico. Contestualmente riceverai informazioni specifiche sui comportamenti sessuali a rischio e sulla modalità di trasmissione e prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse anche in ottica vaccinale.

Inquadra il QR code per conoscere le modalità di accesso dell'ambulatorio:

POLO OSPEDALIERO

PRONTO SOCCORSO

Se hai avuto rapporti sessuali a rischio, come per esempio:
- rottura di preservativo/barriera
- violenza sessuale
- contatto con sangue/fluidi biologici potenzialmente infetti

rivolgiti il prima possibile al Pronto Soccorso (ideale entro 48 ore): ci sarà personale qualificato che valuterà il tuo caso e porrà indicazioni per eventuali terapie preventive.

AMBULATORI INFETTIVI

Rivolgiti al tuo medico di base per eventuale prescrizione di visita medica infettivologica da prenotare al centro di Malattie Infettive a indirizzo Tropicale della ASST Spedali Civili.
La visita medica può essere prenotata al CUP infettivi tel. 0303996610 ore 9.00-11.00
(è necessaria l'impegnativa del medico)

ESISTONO VACCINI PER PREVENIRE MOLTE IST. CHIEDI AI CENTRI VACCINALI!

TELEFONO VERDE AIDS IST 800 861 061
UNITÀ OPERATIVA RCF - DIP. MALATTIE INFETTIVE
Istituto Superiore di Sanità

www.uniticontrolaids.it

a cura degli ambulatori Malattie Infettive ASST Spedali Civili di Brescia - Novembre 2025

Infezioni Sessualmente Trasmesse

IST

Cosa sono
Come prevenirle
Cosa posso fare?

Le Infezioni a Trasmissione Sessuale (IST) includono infezioni che possono essere trasmesse nell'ambito dei rapporti sessuali (vaginali, anali, orali) attraverso:

- contatto delle mucose (vagina, uretra, ano, bocca) con le secrezioni (sperma, liquido pre-spermatico, secrezione cervico-vaginale) contenenti l'agente infettante
- contatto delle mucose con il sangue infetto
- contatto tra le mucose di persone affette da IST

I pripcipali agenti infettanti responsabili di queste malattie a trasmissione sessuale possono essere batteri, virus e protozoi.

Le IST possono decorrere anche senza sintomi o disturbi e, se non vengono riconosciute e trattate in tempo con farmaci specifici, possono essere responsabili di malattie gravi.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Spedali Civili

HPV

È un'infezione dovuta al virus del papilloma umano (HPV).
Costituisce il principale fattore di rischio per molti tumori a carico dell'apparato genitale, sia nell'uomo che nella donna.

Trasmissione
1.Per via sessuale, in qualsiasi tipo di rapporto non protetto con persone che hanno l'infezione.
2.Per contatto cutaneo da lesione cutanea.

Sintomi
Verruche cutanee (definite condilomi) localizzate sui genitali esterni (femminili e maschili), all'interno della vagina, intorno o dentro l'ano e si manifestano come piccole escrescenze. Alcuni tipi di HPV possono provocare, a distanza di anni, la comparsa di lesioni pre-tumorali e di carcinoma del collo dell'utero (cervice uterina).

Sifilide

È un'infezione causata da un batterio Treponema pallidum che può essere presente nelle mucose (orale, anale e genitale) e nelle lesioni cutanee.

Trasmissione
1.Per via sessuale, in qualsiasi tipo di rapporto non protetto con persone che hanno l'infezione.
2.Da madre a bambino durante la gravidanza.
3.Attraverso sangue infetto.

Sintomi
La sifilide si manifesta in modo differente a seconda dello stadio clinico:
1.Stadio primario: presenza di un'ulcera non dolente genitale, anale o in cavo orale.
2.Stadio secondario: dopo alcune settimane, comparsa sulla pelle di macchie rosate di varia forma, non pruriginose, con localizzazione anche nel palmo delle mani e pianta dei piedi.
3.Stadio terziario: dopo qualche anno (anche 10 anni), evoluzione verso forme gravi che coinvolgono il cervello, il cuore e le ossa.

HIV

È una malattia infettiva causata dal Virus dell'Immunodeficienza Umana. Questa infezione virale danneggia il sistema immunitario distruggendo i globuli bianchi (linfociti CD4) che svolgono un'importante azione di difesa dell'organismo contro le infezioni.

Trasmissione
1.Per via sessuale, in qualsiasi tipo di rapporto non protetto con persone che hanno l'infezione.
2.Da madre a bambino durante la gravidanza, il parto e l'allattamento.
3.Attraverso sangue infetto.

Sintomi
L'infezione all'esordio può essere asintomatica e, se non diagnosticata, può manifestarsi come AIDS a distanza di alcuni anni.

Epatiti Virali

I virus dell'Epatite A, B, C, D, E sono causa di epatite acuta e/o cronica.

Trasmissione
L'epatite A/E ha una trasmissione alimentare o orofecale.
L'epatite B/C/D si trasmette attraverso il contatto con sangue infetto, anche attraverso lo scambio con oggetti ad uso personale (aghi, siringhe, sex toys, spazzolini).
È possibile la trasmissione anche dalla madre al bambino durante la gravidanza e il parto.

Sintomi
L'infezione può essere asintomatica, acuta (ittero) o decorrere verso forme croniche fino alla cirrosi epatica e ai tumori del fegato.

Chlamydia

Viene trasmessa dal batterio Chlamydia trachomatis. presente nelle secrezioni purulente dei genitali delle persone con infezione.

Trasmissione
1.Per via sessuale, in qualsiasi tipo di rapporto non protetto con persone che hanno l'infezione.
2.Da madre a bambino durante il parto.

Sintomi
Normalmente presenta secrezioni uretrali e bruciore urinario.
Nella donna l'infezione, anche quando è asintomatica, può causare la malattia pelvica infiammatoria (PID) e infertilità.

Herpes genitale

È un'infezione dovuta al virus Herpes Simplex (tipo 1 e tipo 2) che provoca lesioni vescicolo-ulcerative in corrispondenza dei genitali.

Trasmissione
1.Per via sessuale, in qualsiasi tipo di rapporto non protetto con persone che hanno l'infezione.
2.Da madre a bambino durante il parto.

Sintomi
Una volta che si è contratta l'infezione, il virus può rimanere nascosto nel corpo per tutta la vita. In caso di abbassamento delle difese immunitarie, il virus si riattiva con la comparsa di vescicole genitali, anali e/o labiali.

Gonorrea

È causata dal batterio Neisseria gonorroheae presente nelle secrezioni purulente dei genitali delle persone con infezione.

Trasmissione
1.Per via sessuale, in qualsiasi tipo di rapporto non protetto con persone che hanno l'infezione.
2.Da madre a bambino durante il parto.

Sintomi
L'infezione si manifesta con secrezioni purulente dei genitali, bruciore e difficoltà ad urinare. Se non trattata farmacologicamente può portare a sterilità, sia nella donna sia nell'uomo.

Mpox

È una malattia infettiva causata dal monkeypox virus (MPXV). Provoca prevalentemente lesioni della pelle e delle mucose (orale, anale e genitale).

Trasmissione
1. Per via sessuale, in qualsiasi tipo di rapporto non protetto con persone che hanno l'infezione
2. Per contatto diretto con lesioni della cute di una persona infetta o oggetti contaminati
3. Per via respiratoria (meno frequente)
4. Da madre a bambino durante la gravidanza o il parto

Sintomi
Si manifesta con lesioni della pelle (macchie, vesciche, pustole, croste) o delle mucose accompagnate talvolta da febbre, mal di testa, dolori alle articolazioni, stanchezza, linfonodi ingranditi. In alcuni casi l'infezione può diffondersi ad altri organi e causare malattia grave.

!

EVITA COMPORTAMENTI A RISCHIO

ESEGUI I TEST DI SCREENING PER UNA DIAGNOSI PRECOCE

EVITA RAPPORTI SESSUALI SENZA PROTEZIONE