

VIOLENZA DI GENERE: EFFETTI SULLA SALUTE DELLA DONNA

Dr.a Mariagrazia Fontana

Responsabile interdipartimentale

Tutela della donna sottoposta a maltrattamento

ASST BRESCIA

25 maggio 2017





MORSICATURE



LESIONI DA ARMA BIANCA



Da punta, da taglio, da fendente

ASFISSIE MECCANICHE: STRANGOLAMENTO



Si notano il solco, le ecchimosi e le escoriazioni lasciate dal
laccio

FOGRAFIA DELLE LESIONI

ASFISSIE MECCANICHE: SOFFOCAMENTO



**Raramente lascia
segni, al massimo
ecchimosi
all'interno delle
labbra**

DIAGNOSTICA RADIOLOGICA

Rx

Ecografie (E-FAST)


TAC ...



VIOLENZA SESSUALE

INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE

- HIV
- SIFILIDE
- EPATITE C
- EPATITE B
- CANDIDA
- BATTERIOSI VAGINALI
- CHLAMYDIA TRACHOMATIS
- TRICHOMONAS VAGINALIS
- NEISSERIA GONORREAE
- PAPILLOMA VIRUS



Valutazione del rischio MST nell'abusato

Gli adulti o i bambini che rimangono vittima di un abuso sessuale hanno un rischio elevato di contrarre MST.


(CDC, 2006)

Valutazione del rischio MST nell'abusato

Problemi di determinazione

- A) infezione pregressa o infezione da rapporto abusante
- B) prevalenza con ampia variabilità
- C) profilassi antibiotica
- D) alcune MST senza espressione clinica
- E) elevato drop-out al follow up

Rischio di trasmissione HIV per singola esposizione sessuale



Rapporto orale recettivo con eiaculazione	0,1%
Rapporto vaginale recettivo	0,1- 0,2 %
Rapporto anale recettivo	0,5 - 3%
Rapporto vaginale insertivo	< 0,1%
Rapporto anale insertivo	< 0,1%

PROFILASSI VERSUS TERAPIA

-TERAPIA ANTIBIOTICA PRECOCE PER MALATTIE ORIGINE BATTERICA


-PROFILASSI EPATITE B (IG+ VACCINO ENTRO 7 GG)

-PROFILASSI ANTITETANICA


-PROFILASSI POST ESPOSIZIONE HIV (REGIME A 3 FARMACI ENTRO 72 ORE)

EFFETTI COLLATERALI






Effetti Collaterali (%)



2NRTI+1IP



**Effetti collaterali sono riscontrabili nel 50% dei casi
causa interruzione nel 30% dei casi**



Tollerabilità e Aderenza ai regimi di PPE

Minore tollerabilità e scarsa aderenza è osservata più frequentemente nei soggetti che assumono PPE rispetto a chi assume una terapia antiretrovirale per infezione da HIV.




Quirino et al., Antivir Ther 2000:

confronto tra soggetti in profilassi a 3 farmaci vs soggetti in terapia antiretrovirale a 3 farmaci:

- **% di tossicità 6 volte maggiore** tra i soggetti in PPE (57%) rispetto ai soggetti in terapia ARV (7%);
- **tassi di interruzione 8 volte maggiori** tra soggetti PPE.



Follow up rischio infettivologico e delle malattie sessualmente trasmesse:
 terapie antibiotiche e antiretrovirali

	T0	T10	T20	T30	T60	T90	T120	T180
		T5 						
Ematoch.*	X	X	X	X				
SGOT/SGPT	X	X	X	X	X	X	X	X
HBsAg	X **							X
HDVAb	(X)							(X)
HIVAb	X			X		X		X
HCVAb	X							X
RPR/TPHA	X					X		X
HSV-2 IgG	X					X		X
Tamponi	X	(X)		X				

*emocromo+f, azotemia, amilasi, creatinina, CK, bilirubina

** HBsAb con titolo

Periodi di incubazione delle più diffuse MST

Tipo di infezione	Tempo di incubazione
Infezione da <i>N. gonorrhoeae</i>	12 ore-3 giorni
Infezione da <i>C. trachomatis</i>	7-14 giorni
Herpes genitalis	2-14 giorni
Infezione da <i>T. vaginalis</i>	7-28 giorni
Sifilide	21-90 giorni
Infezione da HIV-1	60-90 giorni
Infezione da HBV	40-90 giorni
Condilomatosi genitale	30-120 giorni o più

WIFE RAPE-STUPRO CONIUGALE

- **La vittima fatica a riconoscerlo**
- **Spesso inserito in contesto di maltrattamento**
- **Reiterato**
- **Culturalmente considerato meno grave**
- **In 53 paesi lo stupro coniugale non è reato**

WIFE-RAPE MULTICULTURALITA'

Maggior dipendenza economica

Mancanza di sostegno familiare e sociale

Sistema di controllo della comunità d'origine

Disinformazione sui loro diritti nel nostro paese

Mancanza di consapevolezza

Espulsione dal contesto se separazione

Paura di perdere il permesso di soggiorno

STUPRO SENZA MEMORIA

- **Assunzione involontaria di droghe**
- **Amnesia del trauma**
- **Pensieri ricorrenti per riempire un vuoto di ricordi**
- **Impossibile elaborare l'amnesia**

LE “ DROGHE DELLO STUPRO ”

amnesia senza perdita di coscienza

- **Acido Gamma-idrossibutirrico (GHB)**
- **Ketamina**
- **E tante altre**



GHB endogeno: sintesi dal precursore GABA regola tra le altre cose il ritmo sonno-veglia, la memoria, il controllo delle emozioni

Assunto a scopo ricreazionale come liquido o solido (pasticche, polvere, capsule) (“Liquid Ecstasy”, “Fantasy” ...)

In Italia è commercializzato con il nome di Alcover®, impiegato come coadiuvante



GHB



PROPRIETÀ FARMACODINAMICHE

Iniziale stato di euforia, disinibizione e rilassamento, che favorisce la socializzazione con il soggetto abusante e ne facilita l'approccio



Subentra successivamente uno stato di sedazione e stordimento senza perdita di coscienza (che consente allo stupratore di prevaricare e vincere la reazione di resistenza della vittima) con amnesia anterograda riguardo alla violenza (impossibile ricostruire la violenza subita)

Ad alte dosi l'intossicazione è urgenza medica: sopore, depressione respiratoria, bradicardia, allucinazioni visive fino al coma

PROPRIETÀ FARMACOCINETICHE

Buon assorbimento per os

Azione rapida (inizio effetto 15-30 min)

Durata effetto circa 1-3 ore

Rapida eliminazione dall'organismo (determinazione chimico-analitica difficoltosa se la vittima si presenta **dopo > 12 ore dall'assunzione):**

Nel **sangue si rintraccia fino a **8 ore** dopo assunzione**

Nelle **urine si rintraccia fino a **12 ore** dopo l'assunzione (in media solo 5% si ritrova nelle urine dopo 6-8 ore)**

Capello: raccolta dopo 1 mese dall'assunzione (si documenta anche a distanza di mesi)

CONSEGUENZE CRONICHE DELLA VIOLENZA SULLA SALUTE DELLE DONNE

- DISTURBI DIGESTIVI
- CEFALEA
- DOLORI CRONICI DIFFUSI
- DOLORE PELVICO CRONICO
- DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS



DISTURBO POST TRAUMATICO

DA STRESS: frequenti accessi in PS

- **Stanchezza cronica**
- **Disturbi del sonno e dell'alimentazione**
- **Riduzione della capacità attenzione**
- **Sindrome depressiva**
- **Fobie, ansia, attacchi di panico, disturbi ossessivo-compulsivi, autolesionismo**
- **Senso di disvalore, di impotenza,**
- **disorientamento**
- **Amnesie**
- **Apatia, anestesia emotiva**
- **Flash back, ricordi persecutori**
- **Abuso di alcool, droghe o psicofarmaci**

DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS STALKING

- 1- Un attore che individua un bersaglio investendolo di una fissazione ideo-affettiva**
- 2- Una serie ripetuta e persistente di comportamenti ossessivi di controllo o di ricerca di contatto o comunicazione**
- 3- Una vittima che percepisce tali comportamenti come intrusivi, sgradevoli e pericolosi, vivendoli come minaccia**

EFFETTI DELLO STALKING

•PSICOLOGICI

- Paura per sé e per i familiari
- Isolamento
- Depressione
- Abusi alcool, farmaci, tabacco

•ECONOMICI

- Telefono
- Serratura
- Macchina
- Lavoro
- Trasferimento

CYBERSTALKING

**Molestie tramite internet
Diffamazioni**

**Intenzioni di terrorizzare la
vittima**

**Premeditazione
Reiterazione**



VIOLENZA PSICOLOGICA

EFFRAZIONE PSICHICA

Progressiva svalorizzazione

Isolamento

Intimidazione

Microconflitti quotidiani

Paura di parlare, chiedere, offendere, deludere

La vittima si vede con gli occhi del maltrattante

Pensiero altrui ostacola il pensiero autonomo

VIOLENZA PSICOLOGICA

PERVERSIONE LOGICA

Derisione di fronte al dolore della vittima

Proporre situazioni di scelta impossibile

Alternare in modo apparentemente casuale violenza e gentilezza

Far agire la vittima in contrasto con i suoi valori e la sua etica per evitare un danno

VIOLENZA ASSISTITA

- La metà dei mariti violenti lo è anche con i figli
- Proteggere la madre, paura del padre
- Disistima della madre, emulazione del padre
- Disturbi attenzione e del comportamento
- Perdita controllo sfinteriale
- Comportamenti devianti, tossicodipendenze
- Depressione
- Disturbo post traumatico da stress
- **Rischio 6 volte maggiore di divenire maltrattanti**

DANGER ASSESSMENT

1. La violenza fisica è aumentata di frequenza e gravità negli ultimi 6 mesi?
2. Ha mai usato un'arma o l'ha mai minacciata con un'arma?
3. Crede che lui sia capace di ammazzarla?
4. E' mai stata percossa quando era in gravidanza?
5. Lui è fortemente e costantemente geloso di lei?

Risposta positiva a 3 domande ha una sensitività dell'83%

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

