


. بعض النصائح لمساعدة الأطفال المرضى بشكل أكثر انتباهاً بغاية تجنب الوقوع


- إذا أرادوا الأهل أن يغيبوا و يتركوا الطفل من دون مراقبة، حتى لفترة بسيطة، يجب أن يتذكروا رفع حاقه السرير (هذا عادةً ضروري كي يمنع الطفل : مثلاً الأطفال من عمر أقل من 6 سنوات، لعدم قدرتهم، الخ). في حال عدم وجودها من المفترض أن تكون ممددة، أعلم في وقتها الموظف



عندما يؤخذ الطفل
بين الذراعين
يفضل الجلوس



تجنب نقل الطفل من قسم عمليات لقسم آخر محمولاً بين الذراعين: إذا كان هذا من الضروري، تأكد من إرتداء أحذية منخفضة الكعب، مستقرة، مع كعب غير متزحلق، و أن يكون مدى النظر حر بشكل أن لا تحدث حوادث مثل الوقوع أو التعثر



راقب بعناية الطفل خلال تنظيف المحيط من قبل الموظفين،
الأرض المبللة ممكن أن تسهل الوقوع



إذا كان من الضروري فتح النوافذ، اجعلها مفتوحة بشكل آمن ولا تترك الطفل من دون مراقبته

حاول تجنب الطفل من أن يجري في الأماكن المتعلقة بالمستشفيات، من أن يتسلق على الأجهزة